

ストレンジック皮下注 長期の特定使用成績調査 ラインリスト

2018年7月3日時点

No	性別	有害事象				
		有害事象名 ^{注1)}	重篤度	本剤投与開始 ～発現の期間 ^{注2)}	因果関係	転帰
1	女	痙攣発作	重篤	0年0ヵ月6日	有	回復
2	男	注射部位結節	非重篤	0年8ヵ月28日	有	回復
4	男	酸素飽和度低下	重篤	0年2ヵ月2日	有	回復
4	男	酸素飽和度低下	重篤	0年7ヵ月19日	有	回復
4	男	酸素飽和度低下	重篤	0年7ヵ月25日	有	回復
4	男	痙攣発作	重篤	0年8ヵ月18日	有	回復
4	男	酸素飽和度低下	非重篤	0年8ヵ月18日	有	回復
4	男	歯の障害	非重篤	0年9ヵ月29日	有	未回復
4	男	歯の脱落	非重篤	0年9ヵ月29日	有	未回復
4	男	肺炎	重篤	0年10ヵ月9日	有	回復
4	男	筋攣縮	重篤	0年10ヵ月9日	有	回復
4	男	酸素飽和度低下	重篤	0年10ヵ月9日	有	回復
4	男	チアノーゼ	重篤	0年10ヵ月26日	有	回復
4	男	心拍数減少	重篤	0年10ヵ月26日	有	回復
4	男	酸素飽和度低下	重篤	0年10ヵ月26日	有	回復
4	男	痙攣発作	重篤	1年0ヵ月17日	有	回復
4	男	酸素飽和度低下	重篤	1年0ヵ月17日	有	回復
4	男	痙攣発作	重篤	1年2ヵ月5日	有	回復
4	男	痙攣発作	重篤	1年2ヵ月15日	有	回復
4	男	注射部位硬結	非重篤	1年2ヵ月15日	有	回復
4	男	注射部位硬結	非重篤	1年4ヵ月14日	有	回復
4	男	心拍数減少	非重篤	1年6ヵ月12日	有	回復
4	男	痙攣発作	重篤	1年6ヵ月19日	有	回復
4	男	心拍数減少	重篤	1年6ヵ月19日	有	回復
4	男	痙攣発作	重篤	1年9ヵ月8日	有	回復
5	男	湿疹	非重篤	0年0ヵ月10日	有	回復
6	女	アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	非重篤	0年2ヵ月6日	有	回復
6	女	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	非重篤	0年2ヵ月6日	有	回復
7	女	外骨腫	非重篤	0年5ヵ月28日	有	軽快
7	女	四肢X線異常	非重篤	0年11ヵ月29日	有	不明

No	性別	有害事象				
		有害事象名 ^{注1)}	重篤度	本剤投与開始 ～発現の期間 ^{注2)}	因果関係	転帰
8	女	頭蓋骨癒合症	重篤	0年6ヵ月17日	有	未回復
8	女	中和抗体陽性	非重篤	0年9ヵ月 ^{注3)}	有	不明
9	女	裂肛	非重篤	0年6ヵ月7日	有	回復
10	女	湿疹	非重篤	0年4ヵ月0日	有	回復
10	女	湿疹	非重篤	0年7ヵ月27日	有	回復
10	女	血中リン増加	非重篤	0年7ヵ月27日	有	未回復
11	女	腎石灰沈着症	重篤	0年9ヵ月8日	有	未回復
11	女	石灰沈着症	非重篤	0年9ヵ月8日	有	未回復
12	女	血中副甲状腺ホルモン減少	非重篤	0年9ヵ月25日	有	回復
14	女	血中アルカリホスファターゼ異常	非重篤	1年6ヵ月4日	有	回復
15	男	高カルシウム尿症	非重篤	0年6ヵ月3日	有	回復
15	男	歯の脱落	非重篤	0年8ヵ月16日	有	未回復
15	男	注射部位反応	非重篤	0年9ヵ月4日	有	回復
15	男	注射部位変色	非重篤	0年9ヵ月 ^{注3)}	有	未回復
16	女	肺炎	重篤	0年10ヵ月11日	有	回復
17	女	注射部位紅斑	非重篤	0年0ヵ月 ^{注3)}	有	回復
17	女	注射部位硬結	非重篤	0年0ヵ月 ^{注3)}	有	回復
17	女	注射部位痂皮	非重篤	0年0ヵ月 ^{注3)}	有	回復
18	男	多形紅斑	重篤	0年6ヵ月25日	有	回復
18	男	注射部位反応	非重篤	0年6ヵ月29日	有	回復
18	男	注射部位反応	非重篤	2年1ヵ月24日	有	回復
18	男	頭蓋骨癒合症	重篤	2年6ヵ月8日	有	未回復
19	男	高眼圧症	重篤	0年1ヵ月13日	有	回復
21	男	注射部位紅斑	非重篤	0年0ヵ月 ^{注3)}	有	回復
21	男	注射部位そう痒感	非重篤	0年0ヵ月 ^{注3)}	有	回復
21	男	注射部位斑	非重篤	0年0ヵ月 ^{注3)}	有	回復
23	女	四肢の変形	非重篤	0年0ヵ月10日	有	軽快
23	女	頭蓋骨癒合症	重篤	1年0ヵ月4日	有	未回復
25	女	腹水	重篤	0年1ヵ月14日	有	回復
25	女	聴力低下	重篤	0年6ヵ月27日	有	未回復

No	性別	有害事象				
		有害事象名 ^{注1)}	重篤度	本剤投与開始 ～発現の期間 ^{注2)}	因果関係	転帰
28	男	肝機能検査値上昇	非重篤	0年1ヵ月22日	有	回復
29	女	注射部位紅斑	非重篤	0年1ヵ月3日	有	回復
29	女	皮膚炎	非重篤	0年7ヵ月25日	有	回復
30	女	血中アルカリホスファターゼ増加	非重篤	0年6ヵ月5日	有	未回復
32	女	傾眠	非重篤	0年0ヵ月1日	有	回復
32	女	注射部位紅斑	非重篤	0年0ヵ月1日	有	軽快
32	女	注射部位硬結	非重篤	0年0ヵ月1日	有	軽快
32	女	注射部位疼痛	非重篤	0年0ヵ月1日	有	軽快
32	女	投与に伴う反応	非重篤	0年0ヵ月1日	有	回復
32	女	高リン酸塩血症	非重篤	0年5ヵ月18日	有	回復
33	女	注射部位紅斑	非重篤	0年0ヵ月4日	有	回復
33	女	注射部位疼痛	非重篤	0年0ヵ月4日	有	回復
34	男	末梢冷感	非重篤	0年1ヵ月6日	有	回復
34	男	気分変化	非重篤	0年1ヵ月9日	有	軽快
35	男	注射部位紅斑	非重篤	0年0ヵ月1日	有	未回復
35	男	コルチゾール減少	非重篤	0年0ヵ月6日	有	不明
35	男	鎖骨骨折	重篤	0年5ヵ月23日	有	回復
36	女	注射部位疼痛	非重篤	0年0ヵ月1日	有	回復
36	女	注射部位腫脹	非重篤	0年0ヵ月1日	有	軽快
36	女	注射部位硬結	非重篤	0年0ヵ月15日	有	回復
36	女	注射部位腫脹	非重篤	0年8ヵ月22日	有	回復
36	女	伝音難聴	重篤	0年11ヵ月17日	有	軽快
37	女	注射部位反応	非重篤	0年0ヵ月6日	有	軽快
38	男	低カルシウム血症	非重篤	0年0ヵ月2日	有	回復
38	男	四肢痛	非重篤	1年2ヵ月 ^{注3)}	有	回復
38	男	アナフィラキシー反応	重篤	1年2ヵ月14日	有	回復
38	男	アナフィラキシー反応	重篤	1年4ヵ月0日	有	回復
38	男	歯の脱落	非重篤	1年7ヵ月25日	有	未回復
38	男	不正咬合	非重篤	1年7ヵ月25日	有	未回復

注1：有害事象名はMedDRA/J (Ver21.0) の基本語 (PT) にて記載

注2：1ヵ月を30日、1年を12ヶ月として算出

注3：発現日又は転帰日のいずれかの「日」が特定できないため、「年月」のみで算出